



AVERTISSEMENTS AGRICOLES

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

ILE DE FRANCE

Bulletin Technique n°4 du 16 mai 2006 - 1 page

Pomme de Terre

Mildiou

Des parcelles ne sont pas encore complètement levées alors que les plus avancées atteignent 30 cm de pousse. Selon le modèle mildiou, la 3^{ème} génération de mildiou, seuil de déclenchement des interventions pour les variétés sensibles, est atteinte sur l'ensemble des postes météorologiques disponibles ce jour. La 4^{ème} génération est déjà atteinte à Villiers le sec (95).

Situation au niveau du modèle GUNTZ-DIVOUX

Stations météo SRPV – FREDON – données au 15 mai				
Postes	Génération en cours	Date des dernières contaminations	Date prévisionnelle sortie de taches	Pluies (mm) depuis le 09/05
77-Chevry Cossigny	3 ^{ème}	9-10-14/05	16/05	0.5
77-Villeroy	3 ^{ème}	9-10-14/05	17/05	19.5
95-Villiers le Sec	4 ^{ème}	15/05	22/05	6.5
78-Poissy	3 ^{ème}	9-10/05	16/05	4
78-Boissy Sans Avoir	3 ^{ème}	10/05	18/05	1.5
91-Saint Aubin	3 ^{ème}	7 et 10/05	16/05	8.6
91-Abbeville la Rivière	3 ^{ème}	9-10-11-13/05	17/05	10

Pour les variétés dites « sensibles » :

Les variétés sensibles doivent à présent être protégées avec un mancozèbe quelque soit le secteur.

Pour les parcelles où la première application a déjà été faite, renouvelez à 7 jours.

Pour les variétés dites « intermédiaires » :

Pour le secteur de Villiers le Sec (95), un premier traitement à base de mancozèbe est à envisager pour les variétés dites « intermédiaires » avant le 22/05.

Pour les autres secteurs, aucune application ne se justifie.

Pour les variétés dites « résistantes » :

Aucune application ne se justifie.

Doryphore

Les premiers doryphores adultes ont été observés dans le secteur de Nangis (77) sur 10% des plantes. Cette détection est plus précoce qu'en 2005 ou 2004.

Le doryphore hiverne dans le sol entre 25 et 40 cm de profondeur. Sa sortie a lieu au printemps après une pluie et lorsque la température du sol atteint 14°C à la profondeur d'hivernation. Il dévore alors les jeunes feuilles de Pomme de terre. Après accouplement, la femelle commence aussitôt à pondre. Fécondité : 700 à 800 oeufs. La sortie des adultes étant échelonnée, on a souvent des chevauchements de génération. Le doryphore n'est préjudiciable qu'en forte infestation, en empêchant le tubercule de grossir.



Désherbage

Suite aux pluies, on a parfois des levées d'adventices. Un rattrapage anti-graminées est possible avec des produits foliaires : cycloxydime (ex STRATOS ULTRA), cléthodim (OGICE, CENTURION), quizalofop méthyl (TARGAD+, PILOT)...

DS 5° 2006 - 84-113

75



Direction Régionale et
Interdépartementale de
l'Agriculture et de la
Forêt

Service Régional de la
Protection des Végétaux
ILE DE FRANCE
10 rue du séminaire
94516 RUNGIS cedex
Tél : 01-41-73-48-00
Fax : 01-41-73-48-48

Bulletin réalisé avec la
participation de la
FREDON Ile de France

Imprimé à la station
D'Alertes
Agricoles de Rungis
Directeur gérant :
B. FERREIRA